Annexe 10 :

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE – METHODOLOGIE APTISOLE

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : Bailly Christophe

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
48-06	48-06	6,10	limon	Très battant (IB : 2,54)	Légère	0,91	De 2 à 6 mois	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal, pas d'épandage en période d'engorgement du sol, les épandages de printemps recommandés							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : BASSEUX Patrick

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
75-01	75-01	0,67	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	1,18	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
75-04	75-05	1,86	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,79	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
75-05	75-05	4,77	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,79	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
75-06	75-06	3,70	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,77	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
75-07	75-08	0,45	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,16	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
75-08	75-08	2,21	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,16	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
75-09	75-09	5,51	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,15	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
75-10	75-10	2,16	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,76	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : BASSEUX Patrick

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
75-11	75-11	3,16	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,21	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
75-14	75-14	7,64	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,75	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
75-15	75-15	6,43	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Absence	0,8	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
75-16	75-16	2,94	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,75	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
75-17	75-17	2,95	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,75	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
75-18	75-18	0,83	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,24	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
75-19	75-19	2,23	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,75	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
75-21	75-21	6,58	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,81	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
75-22	75-22	3,89	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,76	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
75-23	75-23	5,26	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Absence	0,81	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
75-24	75-08	1,58	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,16	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
75-28	75-28	0,47	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,15	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de							

Exploitation agricole : BASSEUX Patrick

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
	printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
75-30	75-30b	13,95	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,78	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : BIDAULT Gabriel

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
40-13b	40-13b	0,79	argile limoneuse	Peu battant (IB : 1,25)	Absence	0,28	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : BRASSART Laurent

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
86-01	86-01a	19,00	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,63	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
86-02	86-02	7,16	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,75	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
86-04	86-04	2,19	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,8	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
86-11	86-11	7,30	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,14	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
86-12	86-12	2,93	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,7	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
86-14	86-14a	9,99	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,14	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
86-17	86-17	4,04	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,13	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
86-19	86-19	3,91	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,2	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
86-25	86-25	0,96	argile limoneuse	Peu battant (IB : 1,21)	Moyenne	0,15	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de							

Exploitation agricole : BRASSART Laurent

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
	printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
86-26	86-26	1,26	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,68	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
86-27	86-27	7,77	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,17	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
86-28	86-28	2,17	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,17	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
86-30	86-30	2,62	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,65	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : CAMBIER Thérèse

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
MC 91-01	91-01	1,12	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Absence	0,94	De 2 à 6 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
MC 91-03	91-09	0,35	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
MC 91-06	91-09	0,28	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
MC 91-07	91-07	2,36	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
MC 91-08	91-16	3,95	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
MC 91-09	91-09	4,08	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
MC 91-10	91-10	1,44	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
MC 91-11	91-11	4,76	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
MC 91-12	91-09	0,82	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								

Exploitation agricole : CAMBIER Thérèse

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
MC 91-13	91-13	1,52	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
MC 91-16	91-16	2,48	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
MC 91-17	91-10	0,10	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
MC 91-20	91-20	2,92	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
MC 91-22	91-32	0,37	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
MC 91-24	91-16	0,94	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
MC 91-25	91-25	0,76	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
MC 91-26	91-25	0,68	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
MC 91-27	91-27	4,41	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
MC 91-32	91-32	6,62	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
MC 91-35	91-35	1,64	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
MC 91-36	91-36	3,97	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,57	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : CAMBIER Thérèse

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
MC 91-37	91-37	11,21	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,52	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
MC 91-38	91-38	1,54	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : CANESSE Alexandre

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
03-23	47-09	2,40	limon	Très battant (IB : 2,54)	Légère	0,84	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : COUROUBLE

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
109-01	109-01	17,85	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,92	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
109-02	109-02	3,84	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,89	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
109-03	109-03	5,17	limon pur	Très battant (IB : 4,14)	Absence	0,92	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
109-04	109-04	0,59	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,92	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
109-05	109-05	5,99	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,92	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
109-07	109-07	1,66	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,92	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
109-08	109-08	4,05	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,6	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
109-11	109-11	0,47	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,94	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
109-12	109-11	0,19	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,94	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : COUROUBLE

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
109-15	109-15	1,39	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,89	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
109-16	109-16	2,24	limon pur	Très battant (IB : 4,14)	Absence	0,92	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
109-17	109-17	7,97	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,73	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
109-19	109-02	0,24	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,89	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
109-21	109-022	2,71	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,95	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
109-32	109-32	7,07	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,89	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
109-33	109-32	0,10	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,89	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
109-34	109-34	2,51	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,9	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
109 022	109-022	4,85	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,95	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
109 023	109-023	2,84	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,8	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
109 024	109-024	1,88	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,94	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
109 025	109-0205	3,08	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,95	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								

Exploitation agricole : COUROUBLE

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
109 026	109-08	0,98	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,6	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
109 027	109-027	1,70	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,36	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
109 090	109-090	1,26	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,93	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
109 091	109-090	0,99	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,93	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
109 10	109-10	0,82	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,94	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
109 100	109-17	3,00	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,73	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : D'HALLUIN

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
46-05	46-05	4,17	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,19	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
46-12	46-12	2,72	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,13	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
46-14	46-14	2,30	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,1	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
46-15	091	1,20	argile limoneuse	Peu battant (IB : 1,25)	Absence	0,7	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							
46-16	46-16	5,46	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,19	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
46-17	46-04	8,76	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,1	Absence	3

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : DELABRE Michel

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
70-01	70-01	7,98	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,19	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
70-08	70-08	2,11	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,93	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
70-102	70-103	0,83	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,93	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
70-103	70-103	1,91	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,93	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
70-104	70-104	3,51	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,93	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
70-105	70-105	0,38	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,95	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
70-107	70-108b	0,79	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,99	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : DELPLANQUE Pascal

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
33-07	33-07	6,50	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
33-12	33-12	7,80	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
33-17	33-17	1,33	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,24	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
33-19	33-19	2,03	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,94	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : DELVALLEZ Pascal

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
34-10	76-19a	5,36	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,96	Absence	2
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
34-100	76-21	1,50	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
34-28	76-24	2,48	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
34-43	76-16	0,53	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,45	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
34-44	33-44	5,62	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,89	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
34-45	76-18	3,15	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : DEMARQUILLY Philippe

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
35-07a	35-07a	13,40	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,99	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
35-07b	35-07b	5,40	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,95	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
35-35	35-07b	2,72	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,95	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
35-36	MC 35-36	19,48	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,99	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : DENNEQUIN Dominique

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
24-01	(24-01)	8,16	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,78	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
24-04	(24-04)	2,38	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,75	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
24-06	24-06	2,07	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,49	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
24-07	24-07	13,66	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,81	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							
24-12	75-22	1,65	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,76	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
24-13	24-13	8,65	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,16	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
24-14	24-14	6,31	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Moyenne	5,74	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
24-15	24-15b	4,69	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,21	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
24-16	24-16	6,08	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,78	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
24-17	24-17	5,67	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,78	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de							

Exploitation agricole : DENNEQUIN Dominique

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
	printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
24-18	82-13a	6,21	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,81	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
24-23	24-23	1,09	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,42	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
24-90	24-07	0,73	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,81	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : DUPUIT SYLVIE

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
85-01	85-01	14,18	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,83	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
85-02	85-02	3,20	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,98)	Absence	0,82	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
85-05	85-05	1,97	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,67	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
85-06	85-06	13,17	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,8	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
85-07	85-07	1,21	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,82	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
85-08	85-08	1,13	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,98)	Absence	0,77	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL CARIDROIT

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
82-04	82-04	1,54	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,12	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
82-05	82-05	4,54	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,79	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
82-07	82-07	1,24	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,35	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
82-08	82-08	7,21	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,82	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
82-09	82-09	6,54	limon	Très battant (IB : 2,39)	Assez forte	0,16	Absence	2
	Interdit sauf mise en place du dispositif prévu par la réglementation en zone vulnérable, limitant le risque de ruissellement dans ce cas, injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
82-10	82-10a	6,36	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,16	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
82-11	82-11	7,44	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,78	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
82-13	82-13b	15,11	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,78	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus							

Exploitation agricole : EARL CARIDROIT

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
	proche des besoins de la culture							
82-15	82-15b	54,93	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,78	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL Culiez

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
50-04	50-04	3,85	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,45	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
50-05	50-05	0,51	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,32	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
50-10	50-10	1,13	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,95	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
50-12	50-12	1,66	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,77	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
50-18	50-12	1,46	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,77	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL DE LA BLONIERE

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
92-01	92-01	2,41	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,98)	Absence	0,85	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-02	92-02	12,26	limon sablo-argileux	Peu battant (IB : 1,58)	Absence	0,81	De 2 à 6 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-06A	92-06a	9,53	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Absence	0,93	De 2 à 6 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-06B	92-19	1,13	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Absence	0,93	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-09	92-09	14,75	limon sablo-argileux	Très battant (IB : 3,75)	Absence	0,86	De 2 à 6 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-12	92-14b	0,80	limon sablo-argileux	Peu battant (IB : 1,58)	Absence	0,81	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-14A	92-14a	7,92	limon sablo-argileux	Peu battant (IB : 1,58)	Absence	0,81	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-14B	92-14b	3,37	limon sablo-argileux	Peu battant (IB : 1,58)	Absence	0,81	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-16	92-17	3,02	sable argilo-limoneux	Peu battant (IB : 0,87)	Absence	0,75	De 2 à 6 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								

Exploitation agricole : EARL DE LA BLONIERE

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
92-17	92-17	1,65	sable argilo-limoneux	Peu battant (IB : 0,87)	Absence	0,75	De 2 à 6 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-19	92-19	2,11	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Absence	0,93	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-21	92-21	3,94	argile limono-sableuse	Peu battant (IB : 0,76)	Moyenne	0,95	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-22	92-22	2,24	limon sablo-argileux	Peu battant (IB : 1,58)	Absence	0,87	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-24	92-24	1,61	limon sablo-argileux	Peu battant (IB : 1,58)	Absence	0,88	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-25	92-14b	1,76	limon sablo-argileux	Peu battant (IB : 1,58)	Absence	0,81	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-26	92-26	5,90	limon sablo-argileux	Peu battant (IB : 1,58)	Absence	0,83	De 2 à 6 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-27	92-17	2,19	sable argilo-limoneux	Peu battant (IB : 0,87)	Absence	0,75	De 2 à 6 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-28	92-24	0,53	limon sablo-argileux	Peu battant (IB : 1,58)	Absence	0,88	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-29	92-17	4,73	sable argilo-limoneux	Peu battant (IB : 0,87)	Absence	0,75	De 2 à 6 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-30	92-30	3,42	limon sableux	Très battant (IB : 2,68)	Absence	0,9	De 2 à 6 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-31	92-31	4,24	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,89	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								

Exploitation agricole : EARL DE LA BLONIERE

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
92-35	92-09	1,10	limon sablo-argileux	Très battant (IB : 3,75)	Absence	0,86	De 2 à 6 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-40	92-40	7,71	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,98)	Absence	0,84	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
92-46A	92-46Ab	14,69	limon sableux	Très battant (IB : 2,68)	Absence	0,87	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-46B	92-46B	15,23	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,98)	Absence	0,83	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-46C	92-46C	4,03	argile	Peu battant (IB : 0,38)	Absence	0,89	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-48	92-48	7,52	argile limoneuse	Peu battant (IB : 1,21)	Moyenne	0,9	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
92-53	92-53	1,35	argile	Peu battant (IB : 0,38)	Assez forte	0,95	Absence	2
Interdit sauf mise en place du dispositif prévu par la réglementation en zone vulnérable, limitant le risque de ruissellement dans ce cas, injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL de la Maison Blanche

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
04-02c	4-02c	11,80	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,25	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
04-03	4-03	1,76	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,76	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
04-05	4-05	9,03	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,31	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL DEBLOCK Laurent

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
26-01	26-01	2,04	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,92	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
26-02	26-02	10,41	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,28	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
26-04	26-04	5,66	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,97	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							
26-05	26-05	8,00	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,96	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							
26-07a	26-07 a+b	3,46	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Légère	0,59	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							
26-07b	26-07 a+b	1,46	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Légère	0,59	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							
26-08	26-08	1,83	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,34	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
26-10	26-10	8,22	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
26-19	26-05	6,69	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,96	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							
26-23	26-23	4,45	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,89	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : EARL DEBLOCK Laurent

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
26-27	45-03	5,96	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,47	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
26-28	26-28	3,41	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,91	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
26-34a	26-34a	4,11	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,87	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
26-55	26-55b	37,01	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,87	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
26-56	26-55b	34,80	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,87	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
26-57	26-57b	9,89	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,92	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
26-58	26-58	7,85	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,87	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL DEHAY Dominique

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
41-18	41-18	4,50	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
41-19	41-19	6,48	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,48	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
41-20	09-18b	2,11	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,47	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
41-21	09-18b	2,44	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,47	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL DEKERLE

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
06-02BIS-C	96-09	0,50	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,82	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
06-19	6-19	2,74	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,24	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
06-22	96-11	1,39	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,16	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
06-23	1-08	1,88	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,27	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
06-33	06-33	0,68	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,22	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
06-34	06-34	1,37	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,17	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
06-35	06-35	6,37	limon	Peu battant (IB : 0,28)	Absence	0,66	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							
06-36	06-36	1,53	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,91	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL DELATTRE

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
111-01	111-01	2,33	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,29	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
111-03	111-03	4,13	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,75	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
111-04	102-04	1,69	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,76	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
111-06	75-23	5,13	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Absence	0,81	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
111-07	111-03	2,06	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,75	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
111-08	111-08	14,22	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,8	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
111-09	75-16	1,59	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,75	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
111-11	75-10	2,87	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,76	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
111-12	111-29	0,79	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,69	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : EARL DELATTRE

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
111-14	81-03	15,71	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,75	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
111-15	111-15	1,29	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,77	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
111-17	24-23	0,42	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,42	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
111-21	111-21	12,13	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,79	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
111-23	111-23b	27,99	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,8	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
111-29	111-29	3,67	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,69	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
111-30	24-06	0,92	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,49	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
111-33	24-06	2,01	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,49	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
111-40	6-13	1,09	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,17	Absence	3
111-57	111-29	0,16	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,69	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
111-59	111-29	1,81	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,69	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
111-62	111-62	0,97	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,19	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : EARL DELATTRE

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
111-65	75-09	0,63	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,15	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
111-76	111-76	4,40	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,7	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL DELOFFRE

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
103-01	103-01	6,14	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,86	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
103-02	103-02a	7,59	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,86	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
103-03	103-03	3,63	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,94	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
103-04	103-04a	14,95	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,86	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
103-05	103-04b	3,67	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,86	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
103-06	103-06	7,20	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,22	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
103-15	103-15	0,12	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,86	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
103-16	103-16	6,71	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
103-19	103-04b	3,71	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,86	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : EARL DELOFFRE

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
103-21	103-21	6,39	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,86	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
103-22	103-21	0,42	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,86	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL DESWARTE

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
39-02	39-02	22,71	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
39-03	39-03	5,92	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
39-04	39-04	1,64	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
39-05	39-05	6,02	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
39-06	39-06b	29,75	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
39-07a	39-07ab	18,60	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
39-07b	39-07bb	27,67	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,45	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
39-08	39-08	4,40	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
39-09	39-09	4,03	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : EARL DESWARTE

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
39-10	39-10	4,68	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,46	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
39-12	39-12	7,82	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,8	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
39-22	39-22	4,79	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
39-24	39-24	18,00	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,81	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
39-26	39-26	3,45	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
39-27	39-27	1,20	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
39-28	39-27	0,70	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL DHAINE

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
108-02	108-02	3,13	argile limoneuse	Peu battant (IB : 1,25)	Absence	0,25	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
108-06	111-15	0,86	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,77	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
108-21	96-12	3,51	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,16	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
108-35	108-35	4,47	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,4	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
108-38	63-03b	2,26	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,09	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL DU BOIS VINCENT

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
71-01	71-02	0,94	limon	Très battant (IB : 2,39)	Assez forte	0,15	Absence	2
	Interdit sauf mise en place du dispositif prévu par la réglementation en zone vulnérable, limitant le risque de ruissellement dans ce cas, injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
71-23	71-23	8,40	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,74	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL du Chemin Perdu

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
08-100	08-100	10,30	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,89	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
08-49	08-49	0,81	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,3	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
08-50	08-50	4,49	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,91	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
08-51	08-51	3,10	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,91	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
08-52	08-52	2,36	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,91	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
08-53	08-53	2,36	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,91	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
08-54	08-52	3,21	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,91	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
08-55	74-53	2,36	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,96	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
08-56	08-56	5,30	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,89	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : EARL du Chemin Perdu

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
08-57	08-52	0,91	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,91	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
08-58	08-52	5,16	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,91	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL du maraichon

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
MC 99-10	MC 99-10	1,90	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,7	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
MC 99-30	MC 99-30	9,50	limon	Peu battant (IB : 0,49)	Absence	0,35	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL DU PARADIS

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
79-02	79-02	13,97	argile limono-sableuse	Peu battant (IB : 0,76)	Moyenne	0,89	De 2 à 6 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
79-04	79-04	12,44	limon sableux	Très battant (IB : 2,68)	Moyenne	0,82	< 2 mois	2
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
79-07	92-53	1,94	argile	Peu battant (IB : 0,38)	Assez forte	0,95	Absence	2
Interdit sauf mise en place du dispositif prévu par la réglementation en zone vulnérable, limitant le risque de ruissellement dans ce cas, injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
79-08	79-08	10,19	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,98)	Absence	0,86	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
79-09	79-09	1,85	argile limoneuse	Peu battant (IB : 1,21)	Absence	0,9	De 2 à 6 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
79-10	79-10	3,11	limon sableux	Très battant (IB : 2,68)	Absence	0,76	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
79-11	79-11	16,06	argile limoneuse	Peu battant (IB : 1,21)	Moyenne	0,88	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
79-12	79-12	9,23	sable limoneux	Peu battant (IB : 1,56)	Absence	0,64	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
79-15	79-15	8,14	limon sableux	Très battant (IB : 2,68)	Absence	0,77	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de								

Exploitation agricole : EARL DU PARADIS

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
	printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
79-22	79-22	8,34	limon sablo-argileux	Peu battant (IB : 1,58)	Absence	0,89	De 2 à 6 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
79-23	92-24	1,68	limon sablo-argileux	Peu battant (IB : 1,58)	Absence	0,88	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
79-24	79-24	3,93	sable argilo-limoneux	Peu battant (IB : 0,87)	Absence	0,81	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
79-28	79-28	10,98	limon sablo-argileux	Peu battant (IB : 1,58)	Absence	0,82	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
79-29	79-29	7,61	argile limoneuse	Peu battant (IB : 1,21)	Absence	0,88	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL DU ROMADOUX

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
87-01	87-01	5,30	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
87-02	87-02	2,53	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
87-03	87-03	7,89	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
87-10	87-10	2,95	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
87-11-1	87-11-1	8,79	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
87-11-2	87-11-1	4,38	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
87-12	87-12	4,18	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
87-13	87-10	3,87	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
87-15	87-15	6,95	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							

Exploitation agricole : EARL DU ROMADOUX

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
87-19	87-19	1,90	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
87-20	87-11-1	0,93	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
87-21	87-24	1,94	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
87-25	87-02	2,93	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL DU VERT GALANT

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
74-18	74-18	0,69	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,98	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
74-19	74-18	0,98	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,98	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
74-21	74-18	0,50	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,98	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
74-22	74-22	11,24	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,95	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
74-23	74-23	2,97	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,93	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
74-24	74-24	5,30	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,93	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
74-28	74-28	5,50	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,93	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
74-30	74-30	3,11	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,93	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
74-31	74-31	2,16		Assez battant (IB : 0,00)	Absence	0	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : EARL DU VERT GALANT

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
74-32	74-31	0,34		Assez battant (IB : 0,00)	Absence	0	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
74-35	74-35	0,72	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,97	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
74-36	74-36	3,28	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,98	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
74-39	74-30	1,04	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,93	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
74-42	74-42	1,42	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,89	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
74-43	74-43	1,22	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,89	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
74-44	74-44	3,28	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,24	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
74-53	74-53	2,07	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,96	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL Fatous

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
49-02	65-09	4,10	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,29	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
49-03	49-03	22,34	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,17	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
49-04	(49-04)	8,69	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,16	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
49-08	49-08	2,66	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,16	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
49-09	49-09	0,98	argile	Peu battant (IB : 0,39)	Absence	0,14	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL Fournier

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
63-01	63-04	10,81	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,99	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
63-03a	63-03b	5,12	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,09	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
63-03b	63-03b	1,98	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,09	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
63-08	63-08	4,42	limon argileux	Peu battant (IB : 1,47)	Absence	0,3	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
63-15	63-15	11,87	limon	Très battant (IB : 2,46)	Absence	0,91	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							
63-16	63-16	3,78	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,7	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
63-20	63-20	10,15	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,5	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL GODART

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
107-01	46-04	2,58	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,1	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
107-02	46-04	3,01	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,1	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
107-07	46-14	6,96	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,1	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
107-09	46-05	4,56	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,19	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
107-100	107-101	3,79	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,88	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
107-101	107-101	4,48	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,88	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
107-106	81-24a	7,14	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,79	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
107-12	107-12	8,14	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,84	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
107-13	107-13	5,12	argile limoneuse	Peu battant (IB : 1,25)	Moyenne	0,24	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								

Exploitation agricole : EARL GODART

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
107-20	107-20	0,51	argile limoneuse	Peu battant (IB : 1,25)	Moyenne	0,33	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
107-21	107-101	3,20	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
107-23	107-23	3,84	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,89	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
107-24	107-12	4,31	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,84	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
107-25	107-12	1,60	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,84	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
107-99	107-99	17,65	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,67	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL Honoré

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
61-02	61-02a	5,35	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,32	Absence	2
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
61-03	61-03	4,47	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,74	Absence	2
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
61-04	61-04a	10,66	argile limoneuse	Peu battant (IB : 1,25)	Moyenne	0,62	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
61-06	61-06	1,47	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,73	Absence	2
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
61-13	61-13	1,00	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,59	Absence	2
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
61-17a	61-17ab	10,72	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Moyenne	0,61	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
61-17b	61-17b	7,00	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,72	Absence	2
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
61-18a	61-18a	10,20	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,94	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								

Exploitation agricole : EARL Honoré

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
61-18b	61-18bb	5,30	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,33	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
61-20	61-20	1,28	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,79	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
61-22a	61-22ab	12,78	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,67	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
61-22b	61-22b	11,00	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	1	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL La ferme de Bourcheuil

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
106-01	106-01	3,26	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
106-01 bis	106-01	0,66	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
106-02	106-02	1,24	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
106-03	106-02	17,32	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
106-04	106-04	12,52	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,93	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
106-05	106-05	10,63	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
106-06	106-06	10,58	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
106-07	106-11	13,20	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
106-11	106-11	1,01	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : EARL La ferme de Bourcheuil

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL LALET

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
105-01	105-01	2,26	argile	Peu battant (IB : 0,39)	Absence	0,26	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
105-02	105-02	4,46	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,44	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
105-04	105-14	2,33	argile	Peu battant (IB : 0,39)	Moyenne	0,25	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
105-05	105-05	1,84	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,47	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
105-06	105-06	6,92	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,28	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
105-09	105-09	1,37	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,59	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
105-10	105-10	3,11	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,53	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
105-11	105-11	4,41	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,19	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
105-12	105-12	14,46	argile limoneuse	Peu battant (IB : 1,25)	Moyenne	0,23	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								

Exploitation agricole : EARL LALET

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
105-13	105-09	2,10	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,59	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
105-14	105-14	5,12	argile	Peu battant (IB : 0,39)	Moyenne	0,25	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
105-15	105-15	0,92	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,47	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
105-16	105-16	2,63	argile limoneuse	Peu battant (IB : 1,25)	Absence	0,26	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
105-17	105-17	6,66	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,41	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
105-18	105-18	8,78	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,41	Absence	2
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
105-20	105-20	2,77	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,41	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
105-21	105-21	31,55	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,28	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
105-22	105-22	10,01	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,55	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
105-23	57-12	1,56	argile limoneuse	Peu battant (IB : 1,25)	Absence	0,29	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
105-24	57-10	10,27	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,31	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
105-25	105-25	3,01	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,41	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								

Exploitation agricole : EARL LALET

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
105-26	105-26	3,91	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Moyenne	0,37	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
105-27	105-27	1,80	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,19	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
105-29	105-29	1,42	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,25	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
105-30	105-18	1,32	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,41	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
105-31	105-31	2,27	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,22	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
105-32	105-27	0,68	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,19	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
105-33	105-33	3,47	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,22	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
105-34	105-25	1,25	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,41	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
105-35	105-35	4,70	argile	Peu battant (IB : 0,39)	Absence	0,15	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL LES DERVILLERS

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
84-01-1	84-01-1	6,47	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,95	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
84-01-2	84-01-1	8,77	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,95	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
84-01-3	84-01-3	11,12	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,95	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
84-01-4	84-01-4	5,15	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,95	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
84-02	84-02b	10,50	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,95	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
84-03	84-3	9,45	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,95	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
84-04	84-04	1,34	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,95	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
84-05	84-05	0,85	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,95	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
84-06	84-06b	13,20	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,19	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : EARL LES DERVILLERS

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
84-07	84-07	1,01	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,19	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
84-08	84-08	1,98	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,29	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
84-09	84-09	2,02	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,61	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
84-10	84-10	0,36	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,69	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
84-11	84-11	2,94	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,95	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
84-12	84-12a	14,38	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,95	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
84-13-1	84-13-1	7,79	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
84-13-2	84-13-2a	12,05	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
84-15	84-15	4,26	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,19	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
84-19	84-19	3,30	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Moyenne	0,27	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
84-20	84-20b	12,40	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Absence	0,38	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : EARL LES DERVILLERS

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL LES ROSIERS

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
102-02	75-17	2,83	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,75	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
102-03	6-13	0,57	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,17	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
102-04	102-04	4,49	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,76	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
102-05	111-13	1,12	limon pur	Très battant (IB : 4,14)	Absence	0,75	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
102-06	114-06	2,09	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,75	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
102-07	102-07	1,87	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,77	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
102-09	102-09	2,61	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,83	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
102-12	6-13	1,06	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,17	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
102-14	75-11	2,29	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,21	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : EARL LES ROSIERS

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
102-15	81-13	1,87	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,78	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
102-16	114-06	1,22	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,75	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
102-22	102-22a	14,11	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
102-23	102-23	5,68	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,89	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
102-24	96-07	2,19	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,82	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
102-25	102-25	0,76	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,82	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
102-27	102-26	1,63	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,82	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
102-30	102-25	0,10	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,82	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
102-31	5-19	4,18	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,1	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
102-32	102-32	9,28	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,84	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
102-33	102-33	4,21	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,84	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
102-37	5-31	1,77	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,14	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : EARL LES ROSIERS

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
102-38	102-33	1,52	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,84	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL Petit Delesalle

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
65-13	(65-13)	17,19	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,51	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
65-19	65-19	9,60	limon	Très battant (IB : 2,54)	Légère	0,66	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL SAINTE BERTILLE

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
81-01	81-01	5,38	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,75	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
81-03	81-03	1,28	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,75	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
81-07	81-07	0,17	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,79	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
81-09	81-09	1,21	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,78	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
81-102	81-102	3,50	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,84	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
81-103	81-103	1,38	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,89	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
81-11	81-11	0,71	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,15	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
81-12	81-12	1,41	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,18	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
81-13	81-13	6,03	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,78	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : EARL SAINTE BERTILLE

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
81-14	75-17	2,88	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,75	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
81-15	81-15	6,38	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,75	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
81-16	75-06	6,00	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,77	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
81-17	75-09	1,09	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,15	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
81-19	81-19	1,49	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Moyenne	0,8	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
81-22	81-22	8,84	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,18	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
81-24	81-24a	11,69	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,79	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
81-25	81-25	9,20	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,82	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
81-31	81-31	4,89	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,81	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
81-32	81-01	1,14	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,75	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : EARL THIBAUT LE CHEMIN VERT

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
89-06	89-06	1,36	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,27	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
89-07	89-07	4,38	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Absence	0,7	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
89-08	89-08	1,83	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,65	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
89-09	89-09	1,59	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Absence	0,7	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
89-10	89-10	4,19	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,4	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
89-12	89-12	3,81	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,84	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
89-14	89-14	2,63	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,16	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
89-16	89-16	2,49	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,81	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : EARL THIBAUT LE CHEMIN VERT

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
89-24	89-24	1,28	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,13	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
89-25	89-25	1,20	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,13	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
89-26	89-26	1,08	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,33	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
89-27	89-27	9,95	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,68	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
89-28	89-28	4,86	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,71	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
89-29	89-29a	25,59	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,19	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : FINET Brigitte

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
112-01	81-19	1,47	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Moyenne	0,8	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
112-02	46-12	1,81	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,13	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
112-03	111-03	1,18	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,75	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
112-04	102-07	0,16	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,77	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
112-05	75-09	0,56	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,15	Absence	2
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
112-06	112-06	1,96	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,8	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
112-07	111-15	0,32	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,77	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
112-08	112-08	8,34	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,81	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
112-09	81-13	1,94	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,78	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								

Exploitation agricole : FINET Brigitte

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
112-10	75-05	1,94	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,79	Absence	2
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
112-11	75-05	2,33	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,79	Absence	2
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
112-12	6-13	0,24	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,17	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
112-13	24-06	1,69	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,49	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
112-14	75-23	1,24	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Absence	0,81	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
112-15	114-06	2,43	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,75	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
112-16	24-23	2,03	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,42	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
112-18	114-04	0,26	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,75	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
112-20	81-15	4,54	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,75	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
112-21	114-04	1,85	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,75	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
112-22	81-11	1,81	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,15	Absence	2
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								

Exploitation agricole : FINET Brigitte

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
112-23	75-10	1,26	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,76	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
112-24	75-23	2,85	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Absence	0,81	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : FLAMENT Fabrice

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
MC 100-01	MC 100-01	1,53	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,22	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
MC 100-06	MC 100-06	17,01	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,11	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
MC 100-07	MC 100-07	8,98	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,86	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
MC 100-15	MC 100-15	10,98	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,18	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
MC 100-16	MC 100-16	16,17	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,36	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
MC 100-17	MC 100-18	3,89	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,52	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
MC 100-18	MC 100-18	6,59	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,52	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
MC 100-21	MC 100-21	0,70	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,41	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
MC 100-22	105-31	0,70	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,22	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								

Exploitation agricole : FLAMENT Fabrice

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
MC 100-23	105-31	1,18	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,22	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
MC 100-24	78-10	3,16	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Absence	0,94	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : FRANCOIS Alain

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
114 01	81-19	2,32	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Moyenne	0,8	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
114 02	81-13	4,49	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,78	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
114 03	111-21	1,54	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,79	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
114 04	114-04	1,50	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,75	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
114 05	114-04	0,70	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,75	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
114 06	114-06	1,59	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,75	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
114 07	82-15a	4,38	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,78	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
114 08	114-08	3,67	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,77	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
114 09	114-08	0,29	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,77	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : FRANCOIS Alain

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
114 10	112-06	0,33	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,8	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
114 12	75-11	1,56	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,21	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
114 15	81-11	2,26	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,15	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
114 20	114-20	0,87	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,76	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
114 22	111-15	0,04	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,77	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : GAEC du Gy

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
36-12	BET 36-12b	20,43	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,47	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
36-55	BET 36-55	1,68	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Moyenne	0,28	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
MC 97-02	MC 97-02	5,05	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,68	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
MC 97-08	MC 97-08	0,33	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,15	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
MC 97-09	81-19	1,64	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Moyenne	0,8	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
MC 97-30	MC 97-30	3,35	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,19	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
MC 97-34	MC 97-34	0,64	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,7	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
MC 97-36	MC 97-36	9,75	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,27	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
MC 97-37	75-06	3,06	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,77	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : GAEC du Gy

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
MC 97-38	114-06	0,36	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,75	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
MC 97-39	114-20	0,38	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,76	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
MC 97-40	75-14	3,96	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,75	Absence	2
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
MC 97-41	75-17	0,52	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,75	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
MC 97-47	MC 97-47b	35,53	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,69	Absence	2
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
MC 97-49	MC 97-49	0,38	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,69	Absence	2
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
MC 97-50	MC 97-50	2,05	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,69	Absence	2
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
MC 97-51	MC 97-51	3,02	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,16	Absence	2
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : GAEC Fournier

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
47-02	05-62	5,71	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,82	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
47-05	47-05	4,49	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,27	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
47-06	47-05	0,37	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,27	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
47-07	47-07	4,00	limon	Très battant (IB : 2,54)	Légère	0,68	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							
47-09	47-09	1,92	limon	Très battant (IB : 2,54)	Légère	0,84	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							
47-31	47-31	5,59	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,18	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
47-39	47-39	4,72	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,74	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
47-40	47-40	6,04	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,74	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
47-41	47-41	6,07	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,74	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
47-42	86-06	6,01	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,7	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : GAEC Fournier

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : GAEC GELLEZ

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
101-04	101-04	2,96	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,45	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
101-09	101-09	6,93	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	1,02	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
101-15	101-15	5,81	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	1,02	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
101-01	101-01	3,21	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,12	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
101-05	101-05	6,71	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,65	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
101-20	101-20	3,75	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	1,02	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : GAEC HERMANT

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
72-01	72-01	1,72	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,98	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
72-02	72-02a	22,35	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,19	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
72-03	72-03a	17,69	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,63	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
72-09	72-09	12,60	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,63	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
72-10	70-03b	3,64	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,26	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
72-101	72-101	0,68	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,16	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
72-21	77-22	1,15	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,93	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
72-31	72-101	0,48	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,16	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : GAEC HERMANT

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : GAEC LEBRUN

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
42-02	42-02	7,11	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
42-03	42-03	1,39	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,91	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
42-04	42-04	9,71	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,88	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
42-07	42-07	8,17	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,98	< 2 mois	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal, pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
42-08	42-08	1,25	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,98	< 2 mois	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal, pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
42-10	42-10	1,64	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,97	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							
42-11	42-08	1,47	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,98	< 2 mois	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal, pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
42-13	42-13	1,64	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,95	< 2 mois	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal, pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
42-17	42-17	1,19	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,8	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
42-18	42-18	0,99	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,96	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
42-19	42-38	0,64	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,95	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de							

Exploitation agricole : GAEC LEBRUN

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
	printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
42-20	MC 42-22	8,25	argile limoneuse	Peu battant (IB : 1,25)	Absence	0,93	De 2 à 6 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
42-22	MC 42-22	1,34	argile limoneuse	Peu battant (IB : 1,25)	Absence	0,93	De 2 à 6 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
42-23	MC 42-22	7,90	argile limoneuse	Peu battant (IB : 1,25)	Absence	0,93	De 2 à 6 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
42-26	70-105	4,50	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,95	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
42-27	42-27	8,75	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,84	De 2 à 6 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
42-29	MC 42-29	6,39	argile limoneuse	Peu battant (IB : 1,25)	Absence	0,9	De 2 à 6 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
42-30	42-08	1,71	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,98	< 2 mois	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal, pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
42-33	42-10	0,70	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,97	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							
42-35	42-18	0,30	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,96	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
42-39	42-39	1,05	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,88	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
42-43	42-43	4,14	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,93	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
42-44	42-44	2,49	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,95	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de							

Exploitation agricole : GAEC LEBRUN

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
	printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
42-46	42-46	4,00	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,93	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
42-47	42-47	3,57	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,93	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
42-48	42-48	15,06	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,93	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
42-55	MC 42-57	2,36	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,82	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
42-56	MC 42-57	0,71	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,82	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
42-57	MC 42-57	1,22	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,82	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : GAEC LECLERCQ

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
05-08	5-08	1,47	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,27	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
05-118	05-118	2,91	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Absence	0,19	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
05-119	05-119	1,88	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Moyenne	0,69	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
05-15	5-15	1,97	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,56	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							
05-46	05-46	16,04	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,84	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
05-48	05-48	2,24	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,84	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
05-49	05-49	6,84	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,88	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
05-50	05-50	1,15	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,75	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
05-52	05-52	3,94	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,84	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : GAEC LECLERCQ

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
05-56	05-62	4,15	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,82	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
05-58	06-33	1,11	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,22	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
05-60	05-60b	20,10	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,82	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
05-62	05-62	4,58	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,82	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : GAEC LEFEBVRE

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
76-00	76-00	2,72	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
76-03	76-16	5,36	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,45	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
76-05	76-05	14,81	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
76-08	76-08	4,42	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
76-09	76-09b	20,90	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
76-11	76-11	6,99	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
76-13	76-13	4,38	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
76-14	76-14b	12,44	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,9	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
76-16	76-16	4,27	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,45	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : GAEC LEFEBVRE

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
76-18	76-18	2,04	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
76-19	76-19b	17,51	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
76-21	76-21	1,55	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
76-22	76-23	10,85	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
76-23	76-23	9,57	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
76-24	76-24	13,92	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
76-25	76-25a	14,45	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
76-26	76-26	1,81	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
76-29	76-29	9,87	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,92	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
76-32	76-31	0,90	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,92	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
76-33	76-33	6,29	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,92	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
76-34	76-34	9,66	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,92	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							

Exploitation agricole : GAEC LEFEBVRE

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
76-35	76-35	1,40	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
76-36	76-38	4,23	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
76-37	76-38	1,15	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
76-38	76-38	4,76	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
76-39	76-38	1,94	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
76-40	76-40b	17,48	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,92	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
76-42	76-42	8,37	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,95	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : GOURGUECHON Philippe

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
96-01	96-01	3,43	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,76	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
96-02	96-02a	7,83	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,6	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
96-03	96-03	4,40	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,75	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
96-04	96-04	1,62	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,84	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
96-05	96-05	1,33	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,82	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
96-06	96-05	3,63	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,82	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
96-07	96-07	10,90	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,82	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
96-08	96-08	2,25	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,41	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : GOURGUECHON Philippe

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
96-09	96-09	1,50	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,82	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
96-10	96-10	0,27	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,82	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
96-100	96-20	2,43	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,4	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
96-101	96-101	2,85	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,82	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
96-11	96-11	0,94	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,16	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
96-12	96-12	3,43	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,16	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
96-13	96-13	2,21	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,3	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
96-17	96-17	2,17	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,22	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
96-18	96-18	4,15	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,16	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
96-20	96-20	1,49	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,4	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : HOUILLIEZ Benoit

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
78-01	78-01	2,25	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,24	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
78-03	78-03	9,93	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,29	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
78-04	78-24	2,32	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,24	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
78-05	78-08	4,10	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,38	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
78-06	78-08	1,70	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,38	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
78-08	78-08	3,55	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,38	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
78-09	78-09	4,99	argile limoneuse	Peu battant (IB : 1,21)	Absence	0,57	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
78-10	78-10	1,10	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Absence	0,94	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
78-11	78-11	0,85	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,33	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								

Exploitation agricole : HOUILLIEZ Benoit

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
78-14	78-14	2,22	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,93	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
78-23	78-23	1,52	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,41	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
78-24	78-24	3,04	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,24	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : HOUSIEAUX Omer

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
44-05	44-25	2,09	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,79	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
44-11	76-14a	1,91	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
44-15	76-16	6,53	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,45	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
44-19	44-19+44-20	4,59	limon	Très battant (IB : 2,54)	Légère	0,77	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							
44-20	44-19+44-20	2,92	limon	Très battant (IB : 2,54)	Légère	0,77	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							
44-25	44-25	2,56	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,79	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
44-26	44-26	2,86	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,86	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : MORTREUX David

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
80-02	80-02	9,11	limon sablo-argileux	Peu battant (IB : 1,58)	Absence	0,81	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
80-24	80-24	7,18	sable argilo-limoneux	Peu battant (IB : 0,87)	Absence	0,77	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
80-42	80-42	7,23	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Moyenne	0,93	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
80-50	80-50b	12,25	sable limoneux	Peu battant (IB : 1,56)	Absence	0,75	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : MORTREUX Xavier

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
88-19	88-19	7,33	limon sableux	Très battant (IB : 2,68)	Absence	0,79	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
88-22	88-22	5,31	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Absence	0,91	De 2 à 6 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
88-24	88-24	8,50	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,98)	Absence	0,82	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
88-26	88-26	3,66	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Absence	0,98	De 2 à 6 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
88-32	88-32a	21,96	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,93	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : Potel Christian

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
45-03	45-03	2,80	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,47	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
45-04	45-04	1,63	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,47	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
45-09	45-09	2,10	argile	Peu battant (IB : 0,39)	Légère	0,88	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : RAUX Benoît

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
94-1	94-1	4,25	limon sableux	Très battant (IB : 2,68)	Absence	0,74	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
94-11	94-11	5,93	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
94-12	94-12	4,27	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
94-13	94-13	3,84	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
94-14	94-24	0,49	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
94-15	94-15	2,87	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
94-19	94-19	9,12	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,83	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
94-2	94-2	10,69	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,93	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
94-20	94-20	12,10	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								

Exploitation agricole : RAUX Benoît

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
94-21	94-22	1,34	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
94-22	94-22	1,31	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
94-24	94-24	4,99	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
94-3	94-4	4,76	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,94	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
94-4	94-4	3,18	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,94	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
94-7	94-7	5,12	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,9	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
94-8	94-8	2,58	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
94-9	94-9	3,27	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : RENARD Philippe

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
12-100	12-100	1,40	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,93	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
12-12	12-12	6,24	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,85	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
12-13	12-13	7,77	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
12-15	12-15	5,28	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,92	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
12-16	77-15	0,87	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,29	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
12-20	12-20	8,55	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,91	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
12-24	12-24	1,40	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
12-25	39-26	3,69	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
12-30	77-12	5,23	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,91	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : RENARD Philippe

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
12-31	12-31	8,16	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,92	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
12-70	77-12	0,59	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,91	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : SCEA Bailliet

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
56-05	(56-05)	5,11	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,23	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
56-11a	56-11a	5,67	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,19	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
56-16	37-06	1,97	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,32	Absence	3
56-18	(56-18)	8,21	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,23	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
56-20	53-08	7,59	argile limoneuse	Peu battant (IB : 1,25)	Absence	0,29	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
56-22	56-22	5,40	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,81	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
56-23	56-23	6,19	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,65	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
56-24	56-25	1,45	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,5	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
56-25	56-25	1,80	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,5	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
56-26	56-25	2,11	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,5	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de							

Exploitation agricole : SCEA Bailliet

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
	printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
56-31	56-33	2,05	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,38	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
56-32	56-32	0,36	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,41	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
56-33	56-33	5,87	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,38	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
56-34	56-34	6,37	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,99	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
56-36	56-36	1,43	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,49	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
56-40	56-40	6,77	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,92	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
56-41	56-41	6,30	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,97	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
56-42	56-42	7,38	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,97	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
56-43	56-43	6,83	limon pur	Très battant (IB : 3,89)	Absence	0,97	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : SCEA BATIQUE

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
01-08	(1-08)	11,42	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,21	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
01-20	3-14	6,62	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,63	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : SCEA de la Haute Rue

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
93-01	92-21	1,66	argile limono-sableuse	Peu battant (IB : 0,76)	Moyenne	0,95	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
93-02	92-21	0,48	argile limono-sableuse	Peu battant (IB : 0,76)	Moyenne	0,95	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
93-04	93-12	3,27	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,97	Absence	2
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
93-06	93-06	3,62	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,89	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
93-07	93-07	7,13	argile limoneuse	Peu battant (IB : 1,21)	Assez forte	0,85	Absence	2
Interdit sauf mise en place du dispositif prévu par la réglementation en zone vulnérable, limitant le risque de ruissellement dans ce cas, injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
93-12	93-12	4,38	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,97	Absence	2
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
93-15	93-15	2,57	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,89	De 2 à 6 mois	2
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
93-19	79-04	1,95	limon sableux	Très battant (IB : 2,68)	Moyenne	0,82	< 2 mois	2
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								

Exploitation agricole : SCEA de la Haute Rue

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
93-20	79-04	1,65	limon sableux	Très battant (IB : 2,68)	Moyenne	0,82	< 2 mois	2
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
93-22	79-04	2,00	limon sableux	Très battant (IB : 2,68)	Moyenne	0,82	< 2 mois	2
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
93-23	92-21	0,88	argile limono-sableuse	Peu battant (IB : 0,76)	Moyenne	0,95	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
93-24	93-25	0,97	limon sablo-argileux	Peu battant (IB : 1,58)	Absence	0,88	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
93-25	93-25	2,39	limon sablo-argileux	Peu battant (IB : 1,58)	Absence	0,88	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
93-26	79-08	6,31	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,98)	Absence	0,86	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
93-27	93-27	5,54	limon sablo-argileux	Peu battant (IB : 1,58)	Absence	0,87	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : SCEA DECOURCELLE

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
73-02	73-02	2,25	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,48	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
73-03	73-03a	14,27	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	1,07	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
73-04	73-04	2,09	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,98)	Absence	0,79	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
73-07	73-07	5,44	limon sableux	Très battant (IB : 2,68)	Absence	0,77	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : SCEA GRUSON

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
110-01	110-01	9,20	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	1	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-02	110-02	5,15	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,98	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-05	110-05	0,89	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,27	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-10	110-10	14,54	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,99	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-11	110-11	0,54	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,97	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
110-12	110-12	5,70	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	1,02	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-13	110-13	5,99	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,99	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-14	110-14	3,28	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,35	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-15	110-15	5,01	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,51	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : SCEA GRUSON

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
110-16	110-16	7,69	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,99	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-17	110-17b	24,60	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,26	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-18	110-18	0,59	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	1,01	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-19	110-19	2,87	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	1	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-20	110-20	2,33	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	1	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
110-21	110-21	1,35	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	1	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
110-22	110-22	10,21	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	1	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-23	110-23	4,49	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	1	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-24	110-24	6,47	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	1,02	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-25	110-25	0,35	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	1	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-26	110-26	2,79	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,25	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-27	110-27	3,84	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,19	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : SCEA GRUSON

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
110-28	110-28	5,49	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	1,02	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
110-29	110-29	0,32	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,98	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
110-30	110-30	22,12	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,95	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
110-31	110-22	0,46	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	1	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
110-32	110-32	7,90	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,44	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
110-33	35-07b	5,56	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,95	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
110-34	110-34	1,79	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,87	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
110-35	110-35	3,00	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,87	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
110-36	110-36	9,67	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	1,08	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
110-37	110-37	2,93	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,98	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
110-38	110-38	13,06	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,98	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
110-39	110-39	1,55	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,98	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								

Exploitation agricole : SCEA GRUSON

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
110-40	110-40	1,79	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Moyenne	0,3	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-41	110-41	0,33	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,21	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-42	110-42	2,65	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,21	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-43	110-43	3,05	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	1,04	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-44	110-44	2,40	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	1,2	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-45	110-45	4,92	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,93	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-46	77-22	1,45	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,93	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-47	77-18	5,86	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,93	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-48	110-48	5,41	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	1,01	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-49	110-50	2,90	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	1,01	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
110-50	110-50	0,66	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	1,01	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : SCEA GRUSON

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : SCEA LES 2 VILLAGES

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
115-01	115-01	6,97	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,4	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
115-04	MC 100-18	2,48	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,52	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
115-06	115-06	4,18	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,98	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
115-07	115-07	6,49	limon pur	Très battant (IB : 4,14)	Absence	0,92	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
115-08	115-08	3,12	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,47	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : SELLIE Laurent

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
113-02	113-02	5,03	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,97	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
113-03	113-03	12,45	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,95	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
113-08	113-08a	17,75	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	1	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : SERGEANT Roland

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
16-15	16-15	0,92	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
16-16	16-16b	17,53	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,86	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
16-17	63-20	0,98	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,5	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
16-18	16-18	0,69	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,23	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
16-33	16-33	1,01	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,91	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : SION Christophe

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
90-04	90-04	9,47	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
90-05	90-05	11,40	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
90-06	94-15	1,14	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
90-07	90-08	3,84	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
90-08	90-08	4,91	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
90-12	90-12	5,04	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
90-13	90-13	2,49	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : WANTIEZ Bernard

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
09-06	9-06	9,45	limon	Très battant (IB : 2,54)	Légère	0,77	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							
09-07	(9-07)	4,83	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Absence	0,74	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
09-18b	09-18b	2,10	limon	Très battant (IB : 2,54)	Moyenne	0,47	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : Widehem benedicte

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
66-02	66-02	8,60	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Légère	0,91	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							
66-08	66-08	3,13	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Forte	0,64	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							
66-10	66-10	5,66	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 1,02)	Absence	0,15	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
66-11	66-11	7,30	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Forte	0,94	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							
66-16	66-16	5,75	limon argileux	Assez battant (IB : 1,81)	Légère	0,99	Absence	2
	Epandage suivi ou sur couvert végétal							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : WILLEFERT Simon

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
MC 98-01	98-01a	11,35	limon pur	Très battant (IB : 4,14)	Absence	0,93	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
MC 98-02	98-02	3,85	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,29	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
MC 98-03	98-03	11,96	limon	Très battant (IB : 2,54)	Absence	0,7	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES
Unité de production : Mc CAIN - HARNES
Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Pâteux

Exploitation agricole : WILLOQUAUX Philippe

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
77-01	77-01a	8,56	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,14	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
77-02	77-02	9,82	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Absence	0,75	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
77-03	77-03	9,17	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,69	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
77-04	77-04a	4,70	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,14	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
77-05	77-05	6,32	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Moyenne	0,15	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
77-09	49-09	0,25	argile	Peu battant (IB : 0,39)	Absence	0,14	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
77-10	77-10	2,15	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,53	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
77-11	77-11	6,87	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,97	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
77-12	77-12	2,70	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,91	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								

Exploitation agricole : WILLOQUAUX Philippe

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
77-14	77-14	0,98	limon argileux	Assez battant (IB : 1,73)	Absence	0,32	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
77-15	77-15	3,21	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,29	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
77-17	77-17	2,35	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,93	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
77-18	77-18	2,47	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,93	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
77-19	77-19	1,67	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,93	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
77-20	77-18	2,91	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,93	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
77-21	77-13	0,41	limon	Très battant (IB : 2,39)	Absence	0,21	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
77-22	77-22	2,34	limon	Très battant (IB : 2,39)	Moyenne	0,93	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*